

Tadalafil Inventum

10 mg, tabletki powlekane (tadalafil)

TEST DIAGNOSTYCZNY



UWAGA!

Ten lek, Tadalafil Inventum, zawierający tadalafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek może być dla Ciebie, jeśli jesteś dorosłym (> 18 r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, przejdź do pytań poniżej.

ZAZNACZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA PONIŻEJ - SPRAWDŹ CZY MOŻESZ BEZPIECZNIE PRZYJAĆ LEK	TAK lub NIE WIEM	NIE
Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej)? Jeżeli stosujesz poniższe leki, przyjęcie leku Tadalafil Inventum może zagrażać Twojemu życiu!		
1. nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. izosorbid (np. Effox, Mononit, Olicard)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. pentaerytrytyl (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. molsydominę (np. Molsidomina WZF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy występują u Ciebie następujące objawy związane z chorobami serca/krażenia?		
1. w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawiał się ból za mostkiem w klatce piersiowej	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. zwykła, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca (arytmie), które NIE jest leczone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg), które NIE jest leczone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?		
1. masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. stosujesz leki z powodu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach), takie jak riociguat (np. Adempas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra (tzw. „porażenie oka”)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. rozpoznano u Ciebie ciężkie choroby wątroby	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy występują u Ciebie:		
1. dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. białaczka (choroba nowotworowa krwi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Czy stosujesz leki używane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym?		
1. doksazosynę (np. Adadox, Apo-Doxan, Cardura, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Dozox, Kamiren, Zoxon)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. terazosynę (np. Hytrin, Kornam)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. alfuzosynę (np. Alfabax, Alfurion, Alfuzostad, Dalfaz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. sylodosynę (np. Silodosin, Silodyx, Urorec)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. tamsulosynę (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duitam, Duodart, Dutrozen, Fokusin, Landulosin, Marumax, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostamnic, Ranlosin, Suprostiv, Symlosin, Tamiron, TamisPRAS, Tamoptim, Tamsiger, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Tanyz, Uprox, Urostad)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. dutasteryd (np. Adadut, Avodart, Davoster, Dutafin, Dutasteride, Dutrys, Findarts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. finasteryd (np. Adaster, Androstatin, Androster, Antiprost, Apo-Fina, Finahit, Finamef, Finapil, Finaran, Finaride, Finaster, Finasterid Stada, Finasteride, Finasteridum Bluefish, Finiprost, Finpros, Finxta, Hyplafin, Nezyr, Penester, Propecia, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy jesteś obecnie w trakcie leczenia lekami przeciwbakteryjnymi (antybiotykami)?		
1. erytromycyną (np. Davercin, Erythromycinum TZF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. klarytromycyną (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy stosujesz poniższe leki przeciwgrzybicze?		
1. itrakonazol (np. Ipozumax, , Itrax, Itromyx, Orungal, Trioxal)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole, Fluconazolium, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycon, Fluxazol, Mycosyst)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ketokonazol (np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA) - obecnie stosowany w leczeniu zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czy w ciągu ostatnich 24 godzin pił Pan sok grejpfrutowy?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Przynajmniej
1xTAK
lub NIE WIEM

**Wszystkie
NIE**

ODCZYTAJ WYNIK I ZAZNACZ DECYZJĘ PONIŻEJ W KRATCE:

NIE MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEKU TADALAFIL INVENTUM BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM

LUB

MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEK TADALAFIL INVENTUM

Przed zastosowaniem leku przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek Tadalafil Inventum, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą.

PAMIĘTAJ! Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzroku. Występowanie zaburzeń wzroku jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt, zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz Tadalafil Inventum.